

Poštovani pacijenti,

Pterigij je stanje kod kojeg spojnica oka prerasta preko rožnice oka i može biti uzrok slabijem vidu. Jedini način liječenja je kirurškim zahvatom odstraniti navedenu tvorbu.



PTERIGIJ - PRIJE OPERACIJE

PTERIGIJ - NAKON OPERACIJE

Operativni postupak obavlja se uz lokalnu/lokalnu-potenciranu/opću anesteziju tako da se izbjegne bol u tijeku operativnog zahvata. Nakon davanja anestezije učini se odljuštenje spojnice sa rožnice te se defekt zatvori slobodnim ili kliznim transplantatom uz korištenje resorptivnih šava. Cijeli postupak traje u prosjeku 30-tak minuta.

Nakon završetka operativnog zahvata potrebno je mirovanje u krevetu 2-3 sata uz previjanje.

Kao i svi medicinski postupci i ovaj ima određenu mogućnost komplikacija. Moguće je krvarenje iz mjesta reza, ali ta krvarenja su obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju drugih mjera liječenja. Moguće je prolazni osjećaj žuljanja u oku zbog postojanja šavova.

Rjeđe je moguće da u kasnijem postoperativnom periodu nastane ožiljkasta deformacija tkiva koja zahtijeva kiruršku korekciju i reoperaciju.

Nema zamjene za preporučeni postupak.