

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

Ul. Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Tel: 031 511 511

Fax: 031 512 221

Email: ravnateljstvo@kbco.hr

CARSKI REZ

ŠTO JE CARSKI REZ

Carski rez je kirurški zahvat kojem je cilj rađanje djeteta, a izvodi se pomoću reza na trbuhi i maternici. Izvodi se u slučaju kada bi vaginalni porođaj mogao predstavljati rizik za dijete i roditelju.

KADA JE CARSKI REZ NEOPHODAN

Carski rez se izvodi i kada postoji nesrazmjer između veličine majčine zdjelice i opsega vodeće česti dieteta, u slučaju kada postoji zdielični tumor koji onemogućava vaginalni porođaj kao i u slučaju kada vaginalni porođaj ne napreduje ili postoje znakovi fetalne patnje. Carski rez je neophodan u slučaju kada dolazi do prijevremenog odliuštenja posteljica i posledičnog krvarenja, u slučaju kada posteljica leži na prođajnom putu (placenta praevia) ili dođe do ispadanja pupkovine. Određene bolesti ploda i majke također mogu utjecati na dovršenje porođaja carskim rezom. Carski rez se izvodi i kod određenih nepovoljnih položaja djeteta.

KAKO SE IZVODI CARSKI REZ

Carski rez se radi u općoj ili regionalnoj anesteziji o čijim pojedinostima i potencijalnim rizicima objašnjenje daje liječnik specijalist anestezije.

Učini se poprečni rez nekoliko centimetara iznad stidne kosti te se redom otvaraju slojevi potkože, fascije, razmaknu se mišići te se otvoriti peritoneum. Mokraćni mjeđur se oprezno odvoji od maternice i pritisne prema dolje. Otvori se maternica te se ekstrakcijom za vodeću čest izvadi dijete. Nakon toga izljušti se posteljica te se pristupi šivanju maternice te trbušne stijenke po slojevima.

KOMPLIKACIJE ZAHVATA

Tijekom zahvata može doći do ozljede susjednih organa (crijeva, krvnih žila, mokraćnog mjeđura, mokraćovoda). Rizik za navedene ozljede je povećan ukoliko postoje prijašnje operacije u trbuhi. Nakon carskog reza moguća je infekcija rezne rane, maternice te okolnih organa u operacijskom području. To su stanja koja se liječe antibiotskom terapijom ili u rijetkim slučajevima zahtijevaju kirurško liječenje. Nakon zahvata moguć je poremećaj funkcije mokraćnog mjeđura i crijevne peristaltike koji su najčešće prolaznog karaktera, a ukoliko je potrebno, uspješno se liječe.

OPORAVAK NAKON ZAHVATA

Bolničko liječenje nakon carskog reza traje 4 ili više dana, ovisno o stanju roditelje. Kopče se nakon carskog reza u prosjeku vade 7. postoperativni dan. Po otpustu pacijentica dobiva otpusno pismo s uputama i pripadajućim uputnicama za kontrolne preglede.